

PS et l'indice de Karnofsky (IK)(pdf)

- Références :

- *Karnofsky D. The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer. Columbia University Press, New-York 1949 : 191-205*
- *Oken MM, Creech RH, Tormey DC, Horton J, Carbone PP et al., « Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group », Am J Clin Oncol, 1982 ; 5 : 649-55*

	IK	PS	Etat du patient
Capable de mener une activité normale	100%	0	normal, pas de plainte, pas de signe de maladie
	90%	0	peut mener une activité normale, symptômes mineurs de la maladie, totalement autonome
	80%	1	peut mener une activité normale, mais avec effort, symptômes ou signes mineurs, totalement autonome
Incapable de travailler, capable de vivre chez lui et d'assumer ses besoins personnels, une assistance variable est nécessaire	70%	1	peut se prendre en charge, incapable de mener une activité normale, autonome mais à stimuler
	60%	2	nécessite une aide occasionnelle mais peut prendre en charge la plupart des besoins, semi-autonome
	50%	3	nécessite une aide suivie et des soins médicaux fréquents, semi-autonome
	40%	3	handicapé, nécessite une aide et des soins particuliers
Incapable de s'occuper de lui-même, nécessite des soins hospitaliers ou l'équivalent	30%	3	sévèrement handicapé, dépendant
	20%	3	très malade soutien actif, absence totale d'autonomie
	10%	4	moribond, le processus fatal progresse rapidement